

Reamplasarea stupilor

(extras din „Albinăritul pentru începători” de Franz Lampeitl)

Deseori este necesar, din diferite motive, ca familiile de albine să fie reamplasate. Dacă această mutare este necesară în perioada zborului, trebuie luate anumite măsuri, pentru a nu fi pierdute albinele zburătoare.

Mutarea pe alt teren.

Dacă aceste terenuri sunt la o depărtare mai mare de 3 km de locul inițial, mutarea poate fi făcută fără pierderi de albine zburătoare. Acestea se vor întoarce la colonie, atunci când sursa de cules din noua locație a fost deja explorată, din lipsă de hrană în amplasarea inițială. Acesta este cazul zonelor cu răpită sau păduri. O colonie tânără din zona inițială va putea prelua albinele zburătoare care se întorc.

Mutarea coloniilor pe o distanță de până la 1 km este rareori posibilă fără pierderi de albine zburătoare, căci colonia va fi mutată pe raza normală de zbor a albinelor, și este recomandat să se mute stupul doar într-o perioadă cu puțină activitate. Un moment potrivit este după odihna de iarnă, dar atunci trebuie verificat dacă albinele au realizat deja un zbor de curățare. Este dificilă decizia de a muta colonia pe o rază de 1 până la 3 km de la vechea amplasare. Dacă natura oferă, pe o rază de câteva sute de metri până la noua amplasare, o sursă bună de cules, va fi posibilă o mutare fără pierderi de albine zburătoare. Totuși, în lunile de vară sau toamnă, când hrana este puțină, nu pot fi evitate aceste pierderi. Dacă este neapărat necesară o mutare în această perioadă, vor trebui lăsate câteva colonii și pe terenul vechi.

Mutarea pe același teren.

Când este vorba de colonii așezate individual sau în șir, acestea pot fi mutate cu 0,5 până la 1 m, cu păstrarea direcției de zbor, cu condiția ca anumite semne particulare ale împrejurimilor (de exemplu un arbust) să rămână în aceeași poziție și să fie vizibil. Albinele nu vor observa această mutare și se vor întoarce la stupi. O rotație ușoară, de 45°, nu este dezavantajoasă. Rotațiile mai mari, de 180°, nu trebuie făcute. Albinele vor căuta zile în șir urdinișul în zona inițială. Multe dintre ele vor muri.

O mutare a coloniei pe o distanță mai mare de un metru, chiar și cu păstrarea direcției de zbor, este aproape imposibil de realizat în lunile de vară, de exemplu când sunt așezați noi stupi pe același teren, pentru înlocuirea celor vechi. O mutare intermediară poate rezolva problema. Colonia va fi mutată pentru 3-4 săptămâni pe un teren aflat la 2 până la 3 km distanță. Albinele zburătoare se vor orienta spre noua amplasare. La reșezarea pe terenul vechi sunt, datorită perioadei de viață de numai 4 săptămâni, foarte puține albine zburătoare care mai cunosc împrejurimile. Astfel, vor fi evitate practic pierderile de albine.

Această măsură poate fi luată și atunci când coloniile trebuie mutate pe alte terenuri, la distanțe de circa 100 m. O mutare pe distanțe scurte decurge fără probleme după instalarea iernii, căci albinele pierd orientarea spre locul inițial, în timpul odihnei de iarnă. Este potrivită perioada de după ultima jumătate a lui noiembrie - în funcție de starea vremii. Dacă mutarea are loc spre sfârșitul iernii - februarie-martie - coloniile trebuie să fi realizat deja un zbor de curățare, pentru a nu exista pericolul dizenteriei.