



## FASTAC 10 EC

Face parte din grupa chimica a piretroizilor.

Combate un spectru larg de daunatori, asigura protectia unui numar mare de culturi agricole si protejeaza entomofauna utila (prietenul albinelor).

Mod de actiune:

Prin contact si ingestie asupra adultilor si larvelor

Substanta activa: *alfacipermetrin 100 g/l*

Momentul utilizarii:

Se utilizeaza curativ asigurand o maxima eficienta la aplicarea timpurie, odata cu identificarea primilor daunatori

Nota:

FASTAC 10 EC este incadrat in grupa a III-a de toxicitate

Compatibilitate:

FASTAC 10 EC este compatibil cu majoritatea insecto-fungicidelor din Romania in mod curent

Se utilizeaza curativ, asigurand o eficienta maxima asupra larvelor si adultilor. Se recomanda a fi aplicat la temperaturi ce nu depasesc 23-250C.

In vederea administrarii Fastac 10 CE se dilueaza cu apa, respectiv 2 ml insecticid in 10 l apa pentru 130-200 mp si revine 100-150 ml/ha.

Domeniul de utilizare Doza:

- Combaterea insectelor la cereale 100-150 ml/ha
- Combaterea insectelor la lucerna 150 ml/ha
- Combaterea insectelor la cartof 150 ml/ha
- Combaterea insectelor la legume 100-150 ml/ha
- Combaterea insectelor la legume de sera 200 ml/ha
- Combaterea insectelor la pomi fructiferi 80-100 ml/ha
- Combaterea insectelor la vita de vie 80-100 ml/ha
- Combaterea insectelor la silvicultura 4000 ml/ha